


# Flumist 噴鼻式流感疫苗



藥水以噴霧型式噴入鼻腔

## 使用噴霧型式疫苗：

1. 學童只需坐直，眼望正前方
2. 護士只需將疫苗頂部輕輕放入學童鼻孔內幾毫米，推出半支疫苗的劑量，然後取出疫苗
3. 將疫苗上的半劑分隔夾拉開，再在另一鼻孔重複推出剩餘的劑量，整個接種過程便完成
4. 學童不需吸入藥劑
5. 如接種疫苗後流鼻涕、打乞嚏或擤鼻涕，疫苗有效性也不會受影響，不需要補噴劑量。

	針劑式	噴鼻式
用法	藥水注射入肌肉	藥水以噴霧噴入鼻腔
成分	已死亡的病毒	已弱化的病毒
份量	0.5ml	每邊鼻腔 0.1ml
劑量	9歲以下第一次接種，需在至少 4週後接種第二劑	
適用人士	6 個月或以上	2至49歲
不適用人士	蛋的蛋白質過敏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蛋的蛋白質過敏</li> <li>2. 正同時接受含「阿士匹靈」或「水楊酸鹽類」藥物治療</li> <li>3. 目前患有哮喘</li> <li>4. 2歲與4歲之間的兒童在過去12個月內有喘息病史</li> <li>5. 免疫功能減弱</li> <li>6. 與免疫系統嚴重受抑制的人有緊密接觸</li> <li>7. 在過去48小時內曾經服用抗流感病毒的藥</li> </ol>
相同副作用	可能出現發燒、喉嚨痛及疲倦等症狀	
不同副作用	針口可能紅腫痛	流鼻水或鼻塞